

Aus der Universitäts-Hautklinik Hamburg
Direktor: Prof. Dr. Paul Mulzer

Beitrag zur Epidermolysis bullosa dystrophica

〈Bullosis mechanica dystrophica〉.

Inaugural-Differtation

zur Erlangung der Doktorwürde der
Hohen medizinischen Fakultät der Universität Hamburg

vorgelegt

von

Walter Drosdek

aus

Alt-Berun.

Hamburg 1928.

Beitrag zur Epidermolysis bullosa dystrophica (Bullosis mechanica dystrophica).

Im Jahre 1882 wurde von Goldscheider zum ersten Male die später als Epidermolysis bullosa hereditaria bezeichnete Krankheit beschrieben. Goldscheider beobachtete die Erkrankung an einem 22jährigen Manne, bei dem an allen Stellen des Körpers auf leichte Traumen hin Blasen entstanden, besonders aber an Händen und Füßen, die mehr als andere Körperteile durch dauernde mechanische Verletzung gefährdet sind. Ein einfaches Reiben mit einem Tuch oder mit der Hand war hinreichend, um neue Blasen zu erzeugen. Die Blasen waren von einem schmalen, blaßroten Saume umgeben und von einer hellenwässrigen Flüssigkeit erfüllt. Kamen sie zum Platzen, so ließen sie eine nässende gerötete Fläche zutage treten, die nach 8—10 Tagen, ohne Narben zurückzulassen, abheilte. Der Allgemeinzustand des Patienten war in keiner Weise gestört. Gleich dieser erste Fall gab einen deutlichen Hinweis auf die Heredität des Leidens. Der Vater des Patienten, die Großmutter väterlicherseits, ein Bruder und eine Schwester des Patienten, sowie zwei Kinder der Schwester zeigten die gleiche Erkrankung. Bei der Großmutter hatte sie während des ganzen Lebens bestanden, während bei dem Vater in späteren Jahren ein allmähliches Nachlassen zu bemerken war. Der Goldscheider'schen Veröffentlichung folgte bald eine Reihe von Mitteilungen von Valentin, Köbner, Joseph, Bonaiuti, Lesser und Blumer, denen allen das gleiche Krankheitsbild der typischen Epidermolysis bullosa hereditaria zugrunde lag. Die Erkrankung ist durch drei Momente charakterisiert: durch die fast stets vorhandene Heredität, durch die Entstehung von Blasen auf geringfügige Traumen hin und das im übrigen gute Allgemeinbefinden. Die Heredität wurde von Colombini in drei, von Valentin, Brunner und Török in vier, von Bonaiuti in fünf Generationen nachgewiesen. Fast nie wird eine Generation übergangen, sodaß der Typus der Vererbung ein ausgesprochen dominanter ist. Die Vererbung erfolgt niemals durch die gesunden, sondern stets durch die erkrankten Mitglieder

einer Familie. Von den beiden Geschlechtern ist das männliche mehr als das weibliche betroffen. Der Beginn des Leidens fällt meistens in die ersten Jahre, wenn die Kinder zu gehen beginnen, wenngleich auch einzelne Fälle beschrieben sind, bei denen gleich nach der Geburt Blasen auftraten. Die Krankheit besteht mit wenigen Ausnahmen während des ganzen Lebens und nimmt erst im späteren Alter ab. Die Blasen entstehen nach leichten Verletzungen, vor allem an Händen und Füßen, die dauernden Schädlichkeiten ausgesetzt sind, aber auch an allen anderen Körperstellen, die eine mechanische Einwirkung durch die Kleidung, das Tragen eines Gürtels, eines Korsetts usw. erfahren. An solchen Stellen bildet sich anfangs ein roter, juckender Fleck, der sich nach ungefähr 1—2 Stunden zu einer klaren, prall gefüllten, von einem blaßroten Saum umgebenen Blase umwandelt. Schmerzen fehlen, außer an den Handflächen und Fußsohlen, wo es bei der Dicke der Hornschicht trotz praller Füllung der Blasen seltener zum Platzen kommt. Hier kann der Blaseninhalt öfters hämorrhagisch sein. Die Abheilung erfolgt nach ungefähr 8—14 Tagen, ohne daß Narben und Pigmentationen zurückbleiben. Den Inhalt der Blasen untersuchte zum ersten Male Colombini. Er stellte eine völlige Keimfreiheit desselben fest, ein Befund, der auch in allen späteren Fällen bestätigt wurde. Hinsichtlich der dem Blaseninhalt beigemengten Zellen kam er wie auch spätere Untersucher zu keinem eindeutigen Ergebnis. Bei dem Versuch, die Blasen experimentell zu erzeugen, zeigte es sich, daß die Art der mechanischen Einwirkung nicht gleichgültig war. Plötzliche, schlagartige Traumen waren von keinem Erfolge begleitet. Dagegen führte längeres sanftes Reiben immer zum Ziele. Chemische Argentin, Jodtinktur, Cantharidenpflaster, Ammoniak, Chrom- und Essigsäure, sowie thermische und elektrische Reize vermochten keine Blasenbildung herbeizuführen.

Ungefähr zu gleicher Zeit mit den Veröffentlichungen von Goldscheider, Köbner, Joseph u. a. erschienen im Auslande, besonders in England und Frankreich, Arbeiten, die ein der Epidermolysis bullosa hereditaria in mancher Hinsicht ähnliches Krankheitsbild abhandelten, das von den einzelnen Autoren mit den verschiedensten Namen belegt wurde. Zuerst berichtete Tilbury Fox im Jahre 1879 von zwei Fällen unter der Bezeichnung: »Congenital Ulceration of the Skin with Pemphigus eruption and arrest of Development general.« Im Jahre 1882 veröffentlichte Wickham Legg seine Fälle als: »Cases of Congenital Pemphigus persistent from Birth.« Payne wählte in seinen Arbeiten 1882 und 1884 den Titel: »Traumatic Bullos Affektion resembling Pemphigus.« Weitere Mitteilungen von Colcott Fox und Galloway beschrieben die Erkrankung

als »Congenital Pemphigus«. In Frankreich erfolgte die erste Veröffentlichung durch Vidal im Jahre 1889 unter dem Titel: »Lesions trophiques d'origine congénitale à marche progressiv.« Bald darauf erschienen die Arbeiten von Hallopeau: »Sur une Dermatose bulleuse infantile avec cicatrices endélébiles Kystes épidermiques et manifestations buccales« und von Besnier als: »Ichthyose à poussées bulleuses«.

Den unter so verschiedenen Namen beschriebenen Krankheitsbildern stehen die Ende des 19. Jahrhunderts in der deutschen Literatur mitgeteilten Beobachtungen von Herzfeld, Hoffmann und Ledermann außerordentlich nahe. Es handelt sich hier um eine Erkrankung, die wie die Epidermolysis bullosa hereditaria durch die, wenn auch weniger ausgesprochene Heredität des Leidens und die Neigung zu traumatischer Blasenbildung gekennzeichnet ist. Doch fallen bedeutsame Unterschiede auf, die durch die Lokalisation und die begleitenden Folgezustände gegeben sind. Die Blasenbildung ist auf die Extremitäten, die Extremitätenenden und die prominenten Körperstellen, wie Knie und Ellbogengelenke, beschränkt. Während bei der Goldscheider'schen Form eine völlige Restitutio ad integrum eintritt, kommt es hier zu weitgehenden Veränderungen an der Haut und den Nägeln. Die Haut wird dünn und atrophisch, ist blaurot verfärbt und zeichnet sich durch abnorme Fältelung aus. Estreten Pigmentationen, Milienbildung sowie Hyperkeratosen auf. Die Nägel werden gänzlich zerstört oder sind dystrophisch. Die Beteiligung der Schleimhäute ist häufig. Im übrigen ist der Krankheitsverlauf der gleiche. Ein Nachlassen oder Schwinden der Erkrankung tritt erst im späteren Lebensalter ein. Eine therapeutische Beeinflussung ist nicht möglich und nur der Schutz vor mechanischen Schädlichkeiten kann den Zustand bessern. Das Allgemeinbefinden der Patientin ist ungestört. Die experimentelle Erzeugung der Blasen gelingt ebenso wie bei der typischen Epidermolysis und ist denselben Gesetzen unterworfen.

Was die in vieler Hinsicht von der Goldscheider'schen Epidermolysis bullosa abweichende Erkrankungsform anbelangt, so geht aus der Bezeichnung von Broq hervor, daß er die beiden Krankheitsbilder nicht in Beziehung zu einander setzte. Er hat später die Fälle der französischen Literatur unter dem Namen: »Pemphigus successive à Kystes épidermiques« zusammengefaßt. Auch Hallopeau hat anfänglich in einer Arbeit vom Jahre 1896 die Unterschiede der beiden Erkrankungsformen hervorgehoben, während sie schon 1897 von Wallace Beatty zusammen beschrieben werden. Die Meinungen der einzelnen Autoren über die Zusammengehörigkeit der beiden Krankheitsbilder sind stets geteilte gewesen. Hallopeau selbst hat seine anfängliche Ansicht später geändert und sich zusammen

mit Augagneur dahin geäußert, daß es sich um Abarten ein und derselben Erkrankung handle und drei Formen derselben aufgestellt:

1. La forme bulleuse simple,
2. La Forme bulleuse et dystrophique,
3. La Forme fruste.

Zu der letzten Gruppe rechnete Hallopeau einen von Vidal und einen von ihm selbst beobachteten Fall, bei denen die Blasenbildung weniger ausgesprochen war, die trophischen Störungen dagegen stark in den Vordergrund traten. Hallopeau faßte die Erkrankung nicht wie Vidal als congenitale Dystrophie, sondern als Trophoneurose auf.

Andere Autoren, wie Török haben sich gegen diese Auffassung ausgesprochen. Rona und anfangs auch Bettmann haben einen zuwartenden und kritischen Standpunkt eingenommen. Rona hat betont, daß noch bei keiner Familie beide Erkrankungsformen zusammen beobachtet worden sind. Auch Luithlen scheint der Auffassung zuzuneigen, daß man wohl trotz der Schwierigkeit, eine Zusammengehörigkeit der einzelnen Formen zu bestreiten, für die typische Epidermolysis bullosa eine Sonderstellung beanspruchen müsse, während es bei der anderen Form nicht ausgeschlossen sei, daß trophische Störungen, verbunden mit hereditärer Uebertragung ausschlaggebend sind und die Erkrankung im Sinne Hallopeaus als Trophoneurose gedeutet werden müsse. Bettmann hat später seinen Standpunkt geändert, als er Gelegenheit hatte, an drei Fällen eine Kombination beider Varietäten der Epidermolysis zu beobachten und hat demgemäß die Absicht, die beiden Formen von einander trennen zu wollen, als ein gekünsteltes Bestreben angesehen. Julius K. Mayr und R. Katz haben beide Arten der Erkrankung in ein und derselben Familie an Bruder und Schwester gesehen und wenden sich gegen die Theorie von der Wesensverschiedenheit. Auch Sagakuchi hat die einfache und die dystrophische Epidermolysis zusammen in der gleichen Familie gefunden. Seine Ansicht geht dahin, daß es sich nicht um verschiedene Krankheiten, sondern nur um verschiedene Grade resp. Ausbildungsmodalitäten der gleichen Affektion handelt. Linser und Stühmer, die die gleiche Beobachtung machen konnten, haben sich zur Hallopeauschen Auffassung bekannt. In neuerer Zeit hat Siemens diese Frage eingehend behandelt und ist auf Grund der histologischen Befunde und der Verschiedenheit des Vererbungsmodus zu dem Ergebnis gekommen, daß es sich um zwei verschiedene Krankheitsbilder handle. Während der Vererbungsgang bei der einfachen Epidermolysis in den allermeisten Fällen ein ausgesprochen dominanter ist, handelt es sich bei der dystrophischen Form

um einen rezessiven oder vielfach noch komplizierteren Vererbungsmodus. Die Durchsicht der mitgeteilten histologischen Befunde ergibt, daß die Entstehung der Blasen bei den beiden Formen der Epidermolysis in verschiedenen Schichten der Epidermis erfolgt. Bei der einfachen Epidermolysis liegen die Blasen in den oberflächlichen Schichten des Rete. Es handelt sich um eine Akantholysis oder Keratolysis. Die andere Form, die durch Dystrophien der Nägel, Atrophien und Narben gekennzeichnet ist, zeigt die Bildung der Blasen in tieferen Schichten und ist im wesentlichen eine epidermolytische. Siemens hat daher den Vorschlag gemacht, die Bezeichnung »Epidermolysis« zu vermeiden und durch »Bullosis« zu ersetzen. Er spricht von einer »Bullosis mechanica simplex« und einer »Bullosis mechanica dystrophica«.

Die histologischen Befunde der einzelnen Autoren sind recht verschieden. Goldscheider und Köbner haben als erste die Blasendecke histologisch untersucht. Sie verlegten die Entstehung der Blasen in die Stachelschicht und sprachen von einer Akantholysis. Blumer, Elliot und Colombini sind später der gleichen Ansicht gewesen. Török glaubte, daß der Sitz der Blasen in der Hornschicht gelegen sei und wählte für die Erkrankung den Namen: »Keratolysis bullosa hereditaria«. Gänzlich andere Ergebnisse zeigten die anfangs des 20. Jahrhunderts gemachten Untersuchungen von Bukowski. Engmann-Mook, Petrini-Galatz, Hodara und Beck. Letztere Autoren fanden stets eine vollkommene Ablösung der Epidermis von der Cutis. Sagakuchi konnte diese Befunde bestätigen. Besondere Beachtung hat man den elastischen Fasern geschenkt. Bukowski, der sie zuerst genauer untersuchte, hat keine Veränderung gefunden. Erst Stanislawski (1903), später Engmann-Mook, Hodara, Kaniky und Sutton haben von dem Fehlen der elastischen Fasern, teils nur unter den Blasen, teils auch in Schnitten von normaler Haut berichtet. Sagakuchi ist mit den genannten Autoren in Übereinstimmung, soweit es sich um die unter den Blasen gelegenen Partien handelt. Die elastischen Fasern fehlen fast vollständig in der papillären und subpapillären Schicht. Die Entstehung der Blasen erfolgt immer durch eine Ablösung der Epidermis von der Cutis. Selten ist der Blasengrund von Epithelresten bedeckt. Die oberen Cutisschichten sind ödematös durchtränkt und die Gefäße sind dilatiert.

Über die Pathogenese der Epidermolysis bullosa sind mannigfache Theorien geäußert worden. Goldscheider, Köbner, Joseph, Lesser, Grünfeld u. a. haben eine Anomalie der Stachelschicht und eine auf hereditärer Grundlage beruhende

besonders leichte Ablösbarkeit oder geringere Widerstandsfähigkeit der Epidermis angenommen. Hallopeau und Sée haben die Ansicht ausgesprochen, daß es sich um eine »Adhérence imparfaite de la couche cornée, une fragilité spéciale de la couche épineuse« handle. Köbner glaubte später die Ursache für die leichte Ablösbarkeit der Epidermis von der Cutis in einem abnorm lockeren Zusammenhang beider Schichten sehen zu müssen. Darier erblickte den Grund der Erkrankung in einer »Malformation congénitale« der Epidermis. Engmann-Mook und Kaniky, Sutton haben die Blasenbildung mit dem Fehlen der elastischen Fasern in den oberen Cutisschichten und der dadurch bedingten leichteren Ablösbarkeit der Epidermis erklärt. Stanislawski, Hodara, Beck und Sagakuchi konnten diesen Standpunkt nicht teilen, da ihre histologischen Untersuchungen das Fehlen der elastischen Fasern in der normalen Haut nicht bestätigten. Sagakuchi hat auf die öfters beobachtete Konfanguinität als aetiologischen Faktor hingewiesen. Colombini hat eine Autointoxikationshypothese aufgestellt, die nach ihm nie wieder bestätigt wurde. Nach seiner Ansicht enthalten die Blasen Alkaloide (Ptomaine und Leukomaine), die einen Reiz auf das Gewebe ausüben und zur Blasenbildung führen. Grünfeld glaubte, daß die die Erkrankung oft begleitende Hyperidrosis von Bedeutung sei. Andere Autoren haben ihr Augenmerk mehr auf die Gefäße gelenkt. Kaposi und Lustgarten haben die Erkrankung zur Urticaria bullosa in Beziehung gesetzt. Valentin erblickte in ihr eine Analogie zum akuten Ödem Quinckes. Er wie Blumer und Klebs, Elliot, Luithlen und Török nehmen entweder eine Angioneurose, eine Dysplasia vasorum oder Gefäßveränderungen mit einer gesteigerten Empfindlichkeit derselben als Ursache der Blasenbildung an. Petrini glaubt an nervös-vasomotorische Störung. Linser sah Beziehungen zu Raynaud'scher Erkrankung. Arning beobachtete eine Kombination der Krankheit mit Erythromelie der Hände und Füße. Linser und bes. Stühmer haben die vasomotorischen Störungen mit aller Deutlichkeit hervorgehoben. Sagakuchi hat für keine der erwähnten Theorien eine besondere Bestätigung gefunden. Seiner Auffassung nach muß auf Grund der immer nachweisbaren leichten Ablösbarkeit der Epidermis und auf Grund der Heredität resp. der Bedeutung der öfters beobachteten Konfanguinität für das Auftreten der Erkrankung (in Analogie mit andern kongenitalen Hautanomalien) auf eine angeborene bezw. kongenital angelegte, besonders geartete, d. h. minderwertige Verbindung zwischen Cutis und Epithel und eine besonders ausgebildete Fähigkeit des Papillarkörpers zur Ödembildung geschlossen werden. Da aber die heutigen Untersuchungsmethoden

nicht erweisen können, wie diese Minderwertigkeit sich anatomisch manifestiert, muß sie vorläufig als funktionell bezeichnet werden.

Wie zu ersehen, hat keine der genannten Theorien sich je mit einigem Nachdruck durchsetzen können. Obwohl die klinischen Beobachtungen und Mitteilungen über die Epidermolysis bullosa, sowohl die einfache als die dystrophische Form, im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche geworden sind, so ist trotz mancher Hypothesen die Aetiologie und Pathogenese dieser Erkrankung bisher vollkommen ungeklärt geblieben. Es dürfte aus diesem Grunde angezeigt erscheinen, Fälle, die ihre Besonderheit zeigen und vielleicht geeignet sind, nach dieser oder jener Richtung hin ein Licht auf dieses Krankheitsbild zu werfen, dem bereits vorhandenen Material anzureihen.

Es handelt sich um die 31jährige Patientin A. Cl.

Anamnese: Aus den Angaben der Pat. erfahren wir, daß bd. Eltern nicht besonders kräftige und gesunde Menschen waren, daß der Vater nierenleidend, die Mutter magenleidend war und daß beide in verhältnismäßig frühem Alter mit 45 bzw. 47 Jahren gestorben sind. Von den Großeltern ist nichts bekannt. Zwei Geschwister der Pat., 1 Bruder und 1 Schwester, leben und sind angeblich gesund. Irgendwelche Erkrankungen der Haut sind bei keinem der Angehörigen aufgetreten. Die Pat. selbst ist als Kind an Masern und Lungenentzündung erkrankt. Als junges Mädchen litt sie an Bleichsucht und fühlte sich immer müde und abgespannt. Eintritt der Menstruation mit 17 J. Periode anfangs sehr schmerzhaft, dauerte 5 Tg. und war außerordentlich stark. In den letzten Monaten traten kurz nach Ablauf der fünftägigen Periode nochmals Blutungen von dreitägiger Dauer auf. Seit $1\frac{1}{2}$ J. leidet Pat. an starkem Ausfluß. Von weiteren Erkrankungen ist zu erwähnen, daß in den Jahren 1914 und 1921 eine Entfernung von Nasenpolypen, 1921 ferner eine Abrasio und eine Entfernung von Polypen aus der Gebärmutter stattfand. 1925 lag Pat. im Barmbecker Krankenhaus. Zu dieser Zeit litt sie unter starkem Herzklopfen und anfallsweisen Herzkrämpfen. Während ihres damaligen Krankenhausaufenthaltes wurde eine periarterielle Sympathectomie an beiden Oberarmen vorgenommen. Ein operativer Versuch, dem die Absicht zugrunde lag, die vasomotorischen Störungen an den Händen zu bessern oder zu beseitigen. Diese vasomotorischen Störungen waren ungefähr mit dem 20. Lebensjahr aufgetreten und bestanden in blauer Verfärbung, starkem Kältegefühl und zeitweiligen leichten Sensibilitätsstörungen, wie Taubheitsgefühl und Kribbeln, vornehmlich an den Händen, in geringerem Maße auch an den Füßen. Die Operation hatte keinen wesentlichen Erfolg. Patientin leidet noch jetzt an denselben Erscheinungen. Was das Auftreten von Blasen an der Haut betrifft, so haben

sich solche zum ersten Male in den Jahren 1920/21 gezeigt. Anfangs sind besonders stark das Gesicht, Lippen, Zunge und Mundschleimhaut betroffen gewesen, wenngleich es auch an Blasenbildungen an den Extremitäten nicht gefehlt hat. Eigentümlich ist die Angabe der Pat., daß die Blasen im Gesicht spontan entstanden seien, während die Blasen an den Extremitäten, bes. an den Ellenbogen, den Knien, Händen und Füßen immer mechanischen Insulten ihre Entstehung verdanken. Die Erkrankung im Gesicht hat sich ferner nur in den Jahren 1920/21 und zwar in Schüben von ungefähr $\frac{1}{2}$ jähriger Dauer gezeigt, dagegen hat die Blasenbildung an den Lippen, der Zunge, der Mundschleimhaut, an den Extremitäten, besonders an den vorspringenden und mechanischen Verletzungen ausgesetzten Teilen, bis heutigen Tages unverändert fortbestanden. Allmählich sind im Verlaufe der Erkrankung Veränderungen an der Haut der Streckseiten der Extremitäten, den Handflächen und Fußsohlen und den von Blasen befallenen Körperteilen aufgetreten. Die Blasen waren größtenteils von einer klaren hellen Flüssigkeit erfüllt, seltener haemorrhagisch, pfennig- bis markstückgroß, bestanden ungefähr 8—14 Tage, trockneten dann ein oder neigten zur Vereiterung.

Status praesens: Die Pat. ist groß und schlank gewachsen, Ernährungszustand und Fettpolster sind als normal zu bezeichnen. Haut und sichtbare Schleimhäute sind mäßig durchblutet. Turgor der Haut und Tonus der Muskulatur sind normal. Allgemein befinden jetzt wie auch früher gut.

Kopf: Die Lidspalten sind weit und täuschen einen mäßigen Exophthalmus vor.

Hals- und Rachenorgane: o. B.
Seitliche Halsdrüsen nicht zu tasten. Schilddrüse ist nicht vergrößert.

Lungen und Herz: o. B.

Puls: von mittlerer Füllung und Spannung, gleichmäßig und bdts. gleichzeitig. Pulsfrequenz: 60—70, Blutdruck: 125/80.

Abdomen: flach, weich und eindrückbar. Leber und Milz nicht vergrößert. In der Magengegend ziemlich deutlich umgrenzte Druckschmerzhaftigkeit ohne vermehrte Resistenz. Kein Tumor zu fühlen. Zeitweilig stark kontrahierte Darmschlingen im Gebiete des Colon ascendens und descendens durchzutasten.

Reflexe: Pupillen reagieren prompt auf Lichteinfall und Convergens. Sehnenreflexe sind lebhaft.

Nerven: o. B.

Genitale: Außer Bestehen eines starken Ausflusses o. B.

Haut: Die durch die Erkrankung gesetzten Veränderungen betreffen die Lippen, die Zungen- und Wangenschleimhaut,

ferner die distalen Teile der Extremitäten und sind besonders deutlich an Unterarmen, Händen und Füßen, wie an den Vorsprüngen der Ellenbogen und Kniegelenke. Über den letzteren ist die Haut atrophisch verdünnt, gerunzelt und gefältelt und zeigt einen blaurötlichen Farbenton. Eine ähnliche leichtbläuliche Verfärbung weist die Dorsalseite der Unterarme, der Hände und Füße auf, während die schmal und spitz zulaufenden Finger an ihrer äußersten Kuppe durch eine starke Blässe auffallen. Die Haut über den erwähnten Partien ist gleichmäßig atrophisch verdünnt, was besonders über den Fingergelenken, an den durchschimmernden Gefäßen deutlich wird. Sie ist zart und knittrig, zeigt eine feine und dichte Fältelung, ist stärker verschieblich und aufhebbar, als unter normalen Verhältnissen. Die Fältelung ist eine so ausgesprochene, daß die Haut im Verlaufe der normalen Hautfalten zu einer zarten Leistenbildung aufgehoben ist. Die Atrophie ist eine zusammenhängende und gleichmäßige und geht diffus und unmerklich in die normale Haut der Beugeseiten über. Nirgends bestehen innerhalb derselben Reste oder Inseln von normaler Haut. Sonstige Veränderungen oder Narbenbildungen, mit Ausnahme einzelner zarter bräunlicher Pigmentflecke, sind nicht vorhanden. Wesentlich anders ist das Bild auf den Volar- und Plantarseiten der Hände bzw. Füße. Dieselben sind von einer gleichmäßig bräunlich-gelblichen Hyperkeratose bedeckt, die allein an den Händen durch die normalen Beugungsfalten eine Unterbrechung erleidet. Auch hier fehlt es an isolierten Bildungen, wie Hornzysten oder Milien. Finger- und Zehennägel sind sämtlich dystrophisch, zum Teil gänzlich verkümmert, zum Teil in geringen proximalen Resten vorhanden, die wellig und höckrig verändert sind.

Die Haut der Lippen ist ebenfalls verdünnt und fein gefältelt. Das Lippenrot zeigt einen zarten grauen Schimmer, der sich bei näherer Betrachtung in spritzerartige, grauweiße Flecke auflöst und mit ganz vereinzelt, intensiv-roten Pünktchen und wenigen Pigmentfleckchen vermischt ist. Die Zunge ist glatt und hat einen bläulich-grauen Farbton. Die Papillarschicht auf dem Zungenrücken ist erniedrigt und von kleinen Inseln durchsetzt, die der Papillen entbehren und so gegen das umgebende Niveau eingesunken erscheinen. An der Wangenschleimhaut fanden sich in Höhe des Zahnschlusses, von den Mundwinkeln ausgehend, weißlich-graue, diffusstreifige Einlagerungen.

WaR: —, Urin: o. B.

Erythrozytenzahl: 3.800.000; Hgbl. 65 %.

Differentialbild: Basophile: 0 %, Eosinophile: 0 %, Myelozyten: 0 %, Jugendliche: 0 %, Stabkernige: 4 %, Segmentkernige: 66 %, Lymphozyten: 21 % und Monozyten 8 %.

Es dürfte keinem Zweifel unterliegen, daß der hier beschriebene Fall einen mechanisch bedingten Blasenausschlag und zwar die dystrophische Form desselben darstellt, wie sie durch die Symmetrie, die typische Lokalisation, das Befallensein der Praedilektionsstellen, das gleichmäßige Auftreten von Blasen an Haut und Schleimhäuten, die Dystrophie der Nägel und die mechanische Entstehung der Blasen, sowie das sonstige gute Allgemeinbefinden der Patientin gekennzeichnet ist. Der Pemphigus vulgaris kommt differentialdiagnostisch schon deshalb nicht in Frage, weil bei ihm die Blasen an beliebigen Körperstellen auftreten und nicht ausgesprochen Praedilektionsstellen, wie die Extremitätenenden, befallen. Auch erfolgt die Entstehung der Pemphigusblasen spontan und wird höchstens an Druckstellen mechanisch begünstigt. Das mechanische Moment tritt also ganz an Bedeutung zurück. Ferner fehlt in unserem Falle jegliche Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens. Der benigne Schleimhautpemphigus dagegen ist dadurch charakterisiert, daß bei jahrelang rezidivierender Blasenbildung an den Schleimhäuten, speziell der Mundschleimhaut, bei sonstigem guten Allgemeinbefinden und günstiger Prognose, die Erkrankung auf die Schleimhäute beschränkt bleibt. Diese Beschränkung auf die Schleimhäute ist aber für den benignen Schleimhautpemphigus wesensbestimmend. Weiterhin ist bei Blaseneruptionen der Mundhöhle an den Lichen ruber pemphigoides zu denken. Es fehlen aber in unserm Falle die für Lichen ruber charakteristischen Fleckchen und Leistenbildungen, desgl. ist die äußere Decke frei von irgendwelchen Erscheinungen eines Lichen ruber. Die erwähnten Veränderungen an der Wangenschleimhaut in Höhe des Zahnschlusses stellen unzweifelhaft leukoplakische Bildungen dar.

Die Erkrankung wurde früher als Sclerodermie angesehen, was insofern erwähnenswert ist, als auch seinerzeit Lewin bei Betrachtung des Herzfeldschen Falles an ein Sclerem dachte. Differentialdiagnostisch kommt die als Sclerodaktylie Ball bezeichnete Form der diffusen Sclerodermie in Frage. Die Sclerodaktylie beginnt an den oberen Extremitäten. Die ersten Symptome sind: Nerven- und Gefäßstörungen, Erstarrung der Glieder, Kältegefühl, stechende Schmerzen, lokale Asphyxie und Anaemie. Es sind anfallsweise auftretende Erscheinungen, die mit dem Symptomenkomplex der Raynaudschen Krankheit identisch bzw. weitgehend wesensähnlich und verwandt sind. Diesen Prodromalercheinungen folgt, vielleicht auf dem Wege über ein ödematöses Vorstadium (?), das Stadium der Induration, das zuletzt von dem der Atrophie abgelöst wird. Im Stadium indurativum kommt es zur Verhärtung der Haut. Die Haut wird derb, brethart, die normalen Hautfalten und die feine Riffelung der Haut verschwinden. Sie ist nicht mehr in Falten aufhebbar,

sondern mehr minder fest auf ihrer Unterlage fixiert. Die Farbe der Haut wird alabasterfarben. Die Finger werden tonnenförmig aufgetrieben und die Bewegungsmöglichkeit in den Fingergelenken wird eingeschränkt, bzw. aufgehoben. Beugekontrakturen der Finger sind die Folge der starken Spannung der Haut. Setzen die atrophischen Veränderungen ein, so links die indurierten Partien ein. Die Haut wird zigarettenpapierdünn, ist glatt und gespannt und auf ihrer Unterlage fixiert. Wollte man die bei unserer Patientin bestehenden Hautveränderungen als Endzustand einer Sclerodaktylie ansehen, so müßte man annehmen, daß ein Stadium der Sclerosierung vorausgegangen sei. Davon kann nicht die Rede sein, da nach den anamnestischen Angaben der Patientin nie eine Verhärtung der Haut, tonnenförmige Auftreibung und Beweglichkeitseinschränkung der Finger bestanden hat. Vielmehr hat sich die Atrophie der Haut aus den angioneurotischen Zuständen, die im Anfang allein bestanden haben, progressiv entwickelt. Auch dürften die bei Sclerodaktylie beobachteten Blasen in erster Linie, wenn nicht ausschließlich, im Stadium der angioneurotischen Frühererscheinungen oder aber im Stadium sklerotisans auftreten, nicht jedoch mehr im atrophischen Endzustande, weil hier die Ernährungsverhältnisse, wenn auch unvollkommen, wieder ausgeglichen sind. In unserm Falle entstehen die Blasen rein mechanisch auf bereits atrophischer Haut. Sclerodermatische Prozesse an der Zunge und den Wangenschleimhäuten findet man nicht selten bei diffuser Sclerodermie. Indessen gehen sie nie mit Blaseneruptionen einher, sind also dadurch von unserm Falle völlig verschieden, in dem einerseits die Sclerosierung der Schleimhäute gänzlich vermißt wird, andererseits das Phänomen der Blasenbildung ganz im Vordergrund steht. Nach allem dürfte die Verwechslung mit Sclerodermie nicht möglich sein, wenn man die Symptomatologie und den Verlauf dieser Erkrankung mit der Entwicklung unseres Krankheitsbildes vergleicht.

Wir haben ferner bei der Patientin während ihres hiesigen Aufenthaltes einige Blasen an der Fußsohle, an den Zehen, sowie einmal an der Hand auftreten sehen. Ferner entstanden nach einer Zahnextraktion durch die mechanische Verletzung mehrere Blasen an der Lippe. Es gelang uns weiterhin, durch 1—2 Minuten langes Reiben mit einem Tupfer an den Fingern Blasen zu erzeugen. An andern Stellen mißglückte dieser Versuch. Nach kurzem Reiben mit einem Tupfer kam es nur zur Ablösung eines feinen, dünnen Häutchens, unter dem eine gerötete, leicht nässende Flechte zutage trat. Das Fehlen der Heredität, die späte Manifestation des Leidens dürften die Diagnose nicht zweifelhaft machen, da in der Literatur genügend Fälle bekannt sind, bei denen diese Symptome, Heredität oder

kongenitales Auftreten fehlen. Berichtet doch T ö r ö k bei einer sonst typischen dominant vererblichen Bullosis mechanica simplex von 2 Fällen, bei denen die Erkrankung erst im 21. bzw. 17. Lebensjahr zutage trat. Nach S a g a k u c h i findet man eine hereditäre Belastung und ein familiäres Auftreten bei der Epidermolysis bullosa hereditaria in ungefähr 53 %. Ferner hat Blumer beobachtet, daß selbst dort, wo eine kongenitale Anlage sicher vorhanden ist, das Leiden lange Zeit latent bleiben kann. Ob eine solche bei unserer Patientin bestanden hat, können wir nicht sagen. Ferner könnte man annehmen, daß die Patientin die erste in der Reihe der erblichen Träger sei. Wise und Lautmann haben angesichts dieser sich erst spät entwickelnden Krankheitsbilder von einer »acquirierten« Form gesprochen, ein Ausdruck, den S i e m e n s vermieden sehen möchte, da sich mit dem Ausdruck »acquiriert« die Vorstellung einer Entstehung durch äußere Ursachen zu stark verbindet. Nach der von ihm gewählten Bezeichnung hätten wir es mit einer Bullosis mechanica dystrophica tarda zu tun.

Insoweit wäre die oben beschriebene Erkrankung nicht besonders erwähnenswert, wenn nicht andere Begleiterscheinungen die Aufmerksamkeit in Anspruch nähmen. Es sind dies die ausgedehnten, gleichmäßig zusammenhängenden Atrophien, von denen die distalen Teile der Extremitäten auf ihrer Dorsalseite in auffallend symmetrischer Weise befallen sind. Diese Atrophien lassen an die Akrodermatitis atrophicans H e r x h e i m e r denken. Diese Erkrankung beginnt bekanntlich mit entzündlichen Erscheinungen. Es treten entzündliche, teigig-weiche Infiltrate auf, die eine blaurote bis zinnoberrote Farbe haben und entfernt etwa an das Erythema nodosum erinnern, jedoch flächenhafter als dieses ausgebreitet sind. Im weiteren Verlaufe links die Infiltrate allmählich ein und es greift eine Atrophie Platz. Durch Konfluenz der einzelnen Herde entstehen größere Partien atrophisch-veränderter Haut. Immer aber schreitet der Prozeß unter Bildung neuer entzündlicher Infiltrate in der Peripherie fort. Die atrophische Haut ist außerordentlich dünn, über den Knie- und Ellenbogengelenken gerunzelt, stark gefältet, ohne erkennbares System zerknittert, dagegen an den Stellen, wo die Haut dem Knochen aufliegt, wie über Tibia und Ulna, fast immer glatt und gespannt, glasartig und transparent, sodaß das Gefäßgeflecht abnorm durchschimmert. Eine solche Transparenz und Glätte der Haut ist bei unserm Falle, es sei denn über den Fingergelenken, nicht vorhanden. Die Atrophie ist nicht so vollkommen, wie bei der Akrodermatitis atrophicans, daß sie das Gefäßgeflecht an irgendeiner Stelle mit so gleicher Deutlichkeit durchscheinen läßt. Die atrophische Haut besitzt eine der normalen Haut ähnliche Fel-

derung, unterschieden jedoch dadurch, daß normalerweise die Begrenzung von leichten Furchen gebildet wird, während hier die Hautfelder von zierlichen Leisten emporgefalteter Haut eingefast sind, die in ihrer Gesamtüberlicht ein feinstes Netz- oder Maschenwerk ergeben. Die im ganzen zu weite Haut schmiegt sich ihrer Unterlage mit entschieden erkennbarem System an, wovon bei der Akrodermatitis atrophicans überall da, wo eine Knitterung vorhanden ist, keine Rede sein kann. Diesem strukturellen Unterschied dürfte differentialdiagnostisch vielleicht gelegentlich eine, wenn auch untergeordnete Bedeutung zukommen. Der Übergang von trophischer zu normaler Haut erfolgt in unserm Falle ganz unmerklich. Nirgends bestehen in der Peripherie entzündliche infiltrative Erscheinungen, wie es bei der Akrodermatitis atrophicans nur dann zutreffen würde, wenn der Prozeß zum Stillstand gekommen wäre. Auch haben solche, wie anamnestisch mit Sicherheit auszuschließen ist, nie bestanden oder die Atrophie eingeleitet. Auch geht die Akrodermatitis atrophicans niemals mit jahrelang rezidivierender, mechanisch bedingter Blasenbildung einher. Ferner wird sich die Akrodermatitis atrophicans wohl kaum je mit einer so absoluten Symmetrie an oberen und unteren Extremitäten, wie in unserm Falle, abspielen und der Übergang von atrophischer zu normaler Haut wird wohl nie so unmerklich wie hier erfolgen. Nach allem dürfte auch die Akrodermatitis atrophicans Herxheimer auf Grund des sie charakterisierenden Verlaufes und ihrer Symptomatologie um so mehr auszuschließen sein, als Blaseneruptionen an den Extremitätenenden und gleichzeitig an den Schleimhäuten nicht zu ihrem Bilde gehören.

Atrophien treten allerdings als Folgeerscheinungen der Epidermolysis bullosa dystrophica auf, aber nur insoweit, als sie sich den Blasen anschließen, und dann handelt es sich mehr um circumscripte disseminierte Atrophien. In dem vorliegenden Falle dürfte es jedenfalls nicht ohne weiteres möglich sein, die Atrophien durch die Blasenbildung allein erklären zu wollen. Auch Siemens gibt, indem er ein solches Krankheitsbild beschreibt, zu, daß Fälle vorkommen mögen, in denen eine Erklärung der Atrophie allein durch die Blasenbildung nicht angängig ist, wo man annehmen müsse, daß es sich um die zufällige Kombination zweier immerhin seltener Krankheitsbilder handelt, die man in irgend einen kausalen Zusammenhang zu bringen verlange. Angesichts dieser Tatsache sei noch einmal an jene vasomotorischen Störungen, die bei unserer Patientin ungefähr seit dem 20. Lebensjahr bestehen, erinnert. Es wurde gesagt, daß sie dauernd an Kältegefühl der Hände und Füße litt, daß besonders bei äußeren Temperatureinflüssen eine blaue Verfärbung der Extremitätenenden auftrat, die mit leichten Sensibilitäts-

störungen, wie Taubheitsgefühl und Kribbeln, verbunden waren. Es liegt also bei ihr eine Vasoneurose vor, die wir als Akrozyanose oder als einen mäßigen Grad von Raynaud'scher Krankheit deuten können. Zudem sind noch andere Zeichen einer vegetativen Störung, wie ausgeprägter Dermographismus, starke Hyperidrosis in den Achselhöhlen, das mit Sicherheit anzunehmende Magenulcus, die starken spastischen Kontraktionen des Darmes und die damit verbundene außerordentlich hartnäckige Obstipation zu erwähnen. Es ist nicht der Zweck dieser Arbeit, die Aetiologie und Pathogenese unseres Falles mit diesen Störungen im vegetativen System erklären zu wollen; es sei aber darauf hingewiesen, daß, wie berichtet, viele Autoren die vasomotorischen Störungen hervorgehoben haben und ihnen in der ursächlichen Erklärung dieser bisher dunklen Erkrankung einen wichtigen Platz eingeräumt haben. So rechnet Polland, gestützt auf die Arbeit Sambergers: »Die entzündliche und urtikarielle Hautreaktion« die Blasenbildung bei der Epidermolysis zu den urtikariellen Hautreaktionen. Die Blasen entstehen nicht durch einen entzündlichen Prozeß, sondern ein spezifischer Reiz, im Falle der Epidermolysis ein mechanischer, führt zu einer gesteigerten Lymphsekretion, die das Gefüge der obersten Hautschichten durchtränkt und den Zusammenhang zwischen Corium und Epidermis lockert. Die histologischen Untersuchungen entsprechen dieser Anschauung. Die Lymphspalten sind in der Pars subpapillaris und papillaris bis zur Bildung kleiner Höhlen erweitert. Die Blutkapillaren sind strotzend gefüllt und dilatiert. Die ganze Schicht ist stark ödematös gequollen und von mäßiger zelliger Infiltration durchsetzt. Die Blasendecke besteht aus der ganzen Epidermis. Die einzelnen Zellschichten der Epidermis sind stark gequollen und von Flüssigkeit durchtränkt. Wesentliche degenerative Veränderungen der Zellen sind nicht vorhanden. Es handelt sich also nicht um einen Entzündungsprozeß, sondern um eine Überflutung mit Lymphe, die den Zusammenhang zwischen Epidermis und Corium gelockert und in Form einer Blase abgehoben hat. Die Blasen entstehen in nicht weiter veränderter Haut, der mechanische Reiz genügt um die Hypersekretion der Lymphe, die durch die sekretorische Tätigkeit der Endothelien der Blutgefäßkapillaren geliefert wird, auszulösen. Das Wesen der Erkrankung ist in einer abnormen Reaktion der Hautgefäße auf mechanische Reize zu suchen. Da das Zustandekommen der abnormen Gefäßreaktion der Mitwirkung des Nervensystems bedarf, so ist nach Pollands Auffassung die Epidermolysis als eine echte Angioneurose anzusehen.

Linsler sah Beziehungen der Epidermolysis zu Raynaud'schen Erkrankung. Besonders bei zwei seiner beobachteten Fälle, zwei Brüdern im Alter von 12 und 14 Jahren, waren starke

vasomotorische Störungen vorhanden. Schon bei geringer Abkühlung trat eine von Schmerzen begleitete dunkelblaurote Verfärbung der Hände ein. Auf gelinden Wärmereiz erfolgte ein vollkommenes Abblaffen und Weißwerden der Finger. Bei dem einen der Brüder führte ein harmloses Trauma im Winter zur Gangrän eines Fingers. Die Blasenbildung war im Winter stärker aufgetreten. Die Mutter beider Patienten litt zweifellos an Raynaud'scher Krankheit. Diese Beobachtungen zusammen mit den histologischen Befunden haben Linser zu der Ansicht geführt, daß eine, durch vasomotorische Neurose bedingte Epithelnekrose der Grund der Blasenbildung sei. Ganz besonders deutlich hat Stühmer diese Theorie ausgesprochen. Er beobachtete zwei Brüder, die neben starken Hemmungsmißbildungen Veränderungen des vasomotorischen Systems aufwiesen. Bei beiden bestand neben hochgradigen Dermographismus eine auffallende Akroasphyxie. Die Hände zeigten eine dunkelblaurote Verfärbung, die durch leichte Abkühlung erheblich gesteigert wurde, und auch an den unteren Extremitäten in ausgeprägter Weise auftrat. Die beiden Brüder stammten von blutsverwandten Eltern und waren zusammen mit dem Mangel der Schilddrüse durch Merkmale eines angeborenen Kretinismus gekennzeichnet, sodaß sich Stühmer veranlaßt sieht, die vasomotorischen Störungen auf eine anormale innersekretorische Beeinflussung des Gefäßnervensystems zurückzuführen. Er sagt: »Alle jene Krankheitszeichen auf der Haut und am Gefäßnervensystem, welche im Bilde der Epidermolysis bullosa erscheinen, halte ich für Folgeerscheinungen eines abnormen Reizzustandes der Nervenzentren für die Regulation der Vasomotoren.« Er verweist auf analoge Hautsymptome bei spinaler Gliomatose oder Syringomyelie, wo Dystrophie der Nägel, Asphyxie locale des extrémités in allen Uebergängen bis zum Raynaud, Blasenbildung, Hyperidrosis, ferner Atrophie der Haut usw. beschrieben werden. An anderer Stelle heißt es in der Stühmer'schen Arbeit: »Die symmetrische Lokalisation bezeugt hierbei die Abhängigkeit der Erscheinungen von Veränderungen der nervösen Zentralorgane.« Gerade die Symmetrie der Erscheinungen und die vollkommene Gleichmäßigkeit der Affektion rechts wie links ist es, die auch bei unserm Falle auffällt. Ferner legt sich Stühmer die Frage vor, ob die atrophischen Veränderungen der Haut, die er an seinen Fällen beobachtete, an allen Stellen als Folge der Blasenbildung zu erklären ist. Er zusammen mit Bettmann sind der Auffassung, daß die Blasenbildung nur ein gleichwertiges Symptom unter anderen assoziierten Symptomen darstellt und daß die Nagelfstörungen und Hautatrophien als selbständige Anzeichen einer gemeinsamen Schädigung aufzufassen sind. Die Blasenbildung ist ein Symptom unter manchen

ändern, welche die abnorme trophische zentrale Anlage zum Ausdruck bringt. Schon allein die Tatsache, daß Fälle beschrieben worden sind, wo neben Blasenbildung ohne Narben solche mit echter Dystrophie vorkommt, spricht gegen die Annahme, in den Haut- und Nagelveränderungen Folgeerscheinungen der Blasen zu sehen. Gestützt auf die histologischen Befunde ist Stühmer der Ansicht, daß die dauernde Durchtränkung des Gewebes mit abnorm großen Flüssigkeitsmengen infolge des Fehlens normaler Regulationsvorgänge vom nervösen Zentralorgan aus, die Grundursache für alle jene schweren Hautveränderungen ist. Seine Zusammenfassung lautet dahin: »Nicht die blasige Abhebung der Epitheldecke ist am Krankheitsbild der Epidermolysis bullosa congenita das Wesentlichste. Vielmehr spielt die zentralbedingte Hautdystrophie die Hauptrolle. Es handelt sich also um eine Dystrophia cutis spinalis congenita.«

Ob bei unserer Patientin innersekretorische Störungen, wie bei den Stühmer'schen Fällen vorliegen, ist nicht sicher. Der Gasstoffwechselversuch ergab bei normalem Grundumsatz eine stark herabgesetzte spezifisch-dynamische Wirkung. R. Plaut fand bei 68 Kranken mit Fettsucht und endokrinen Störungen eine Herabsetzung, in einigen Fällen ein Fehlen der spezifisch-dynamischen Wirkung. Fälle von hypophysärer Kachexie und Dystrophia adiposo-genitalis verhielten sich ähnlich, während bei Myxödem trotz niedrigen Grundumsatzes die spezifisch-dynamische Wirkung normal war. R. Plaut stellte deshalb die Hypothese auf, daß der Nahrungsreiz über die Hypophyse wirke und eine verminderte spezifisch-dynamische Wirkung Unterfunktionszustände der Hypophyse anzeige. Liebesny folgerte aus seinen Beobachtungen an einem großen Material, daß eine Verminderung bzw. vollständiges Fehlen der spezifisch-dynamischen Wirkung sich finde:

- a) bei schweren Erkrankungen der Hypophyse,
- b) bei Fettsucht mit Verdacht auf endokrine, und zwar hauptsächlich hypophysäre Genese,
- c) bei Fällen, die mit der Funktion des autonomen Systems zusammenhängen (Sclerodermie, Raynaudsche Krankheit).

Nach Abelin hat die Erregbarkeit der vegetativen Nerven einen nicht unwesentlichen Einfluß auf die Höhe der spezifisch-dynamischen Wirkung. Lichtwitz ist der Auffassung, daß man Veränderungen der spezifisch-dynamischen Wirkung nicht unbedingt mit Funktionsanomalien der Hypophyse in Zusammenhang bringen könne. Ein sicherer Schluß auf eine Hypophysenstörung ist demzufolge in unserm Falle nicht berechtigt und könnte höchstens mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in Betracht gezogen werden.

Die pharmako=dynamischen Versuche ergaben kein eindeutiges Resultat. Nach Pilocarpin erfolgte leichter Schweißausbruch Tränen= und Speichelfluß. Nach Adrelanin stieg der Blutdruck sofort von 125 auf 140 und sank rasch wieder zur Norm zurück, während die Pulsfrequenz noch längere Zeit hindurch eine gesteigerte blieb.

Nicht minder interessant wie die Atrophien sind die an den Volarflächen der Hände und an den Plantae der Füße vorkommenden symmetrischen und gleichmäßig ausgebildeten Hyperkeratosen. Man war in früherer Zeit der Auffassung, daß zwischen der Epidermolysis bullosa und den Keratosen ein inniger Zusammenhang bestehe. Besnier hat für solche Fälle, in denen eine Kombination von Epidermolysis mit Kreatosen beobachtet wurde, den Namen »Ichthyose à poussées bulleuses« eingeführt. T. Fox beschrieb typische Fälle von Bullosis mechanica dystrophica als »neue Varietäten zur Ichthyosis«. Besonders die Ideen Lenglès haben dazu beigetragen, eine Wesensverwandtschaft zwischen der Bullosis mechanica und den Keratosen anzunehmen. Der tiefere Grund für diese Anschauung war neben anderen Erwägungen vor allem wohl der, daß die Bullosis mechanica ebenso wie die Ichthyosis und das Keratoma palmare et plantare zu den kongenitalen Hauterkrankungen gehört. Lenglès hat den inneren Zusammenhang zwischen der Epidermolysis und den Keratosen dadurch zu festigen gesucht, daß er die Häufigkeit der Blasenbildung bei den letzteren betonte. Dagegen ist in einer Reihe von Fällen, wo Blasenbildung bei der Erythrodermie ichthyosiforme congénitale, beim Keratoma palmare et plantare und bei andern Keratosen beobachtet wurde, die mechanisch=bedingte Entstehung der Blasen niemals festgestellt worden. Der Beobachtungen einer Kombination von Epidermolysis und Keratosen sind wenige. Zudem steht bei ihnen die Diagnose entweder der Epidermolysis oder der Keratosis nicht fest. Bei unserer Patientin liegt eine angeborene Keratose nicht vor. Bei den Eltern haben angeblich keine Hauterkrankungen bestanden. Bei ihr selbst sind keinerlei Zeichen einer Ichthyosis vorhanden. Das Keratoma palmare et plantare gehört zu den ausgesprochen hereditären Erkrankungen und beginnt in früher Jugend. Hier dagegen haben sich die Hyperkeratosen erst im Verlaufe der spät einsetzenden Erkrankung allmählich entwickelt. Sie dürften, wenn nicht durch die Blasenbildung allein zu erklären, als Schwielenbildung aufzufassen sein, eine Schutzvorrichtung, die sich die empfindliche, zu Blasenbildungen neigende Haut, an den mechanischer Beanspruchung dauernd ausgesetzten Stellen der Volar= und Plantarflächen geschaffen hat, wofür auch spricht, daß die Hyperkeratosen sich im Laufe der längeren klinischen Beobachtungszeit unter Fortfall jeder Tätigkeit auf der Station,

bedeutend zurückgebildet haben. Auch die normale Haut reagiert auf starke mechanische Inanspruchnahme hin anfangs mit Blasenbildung. Späterhin treten nach Gewöhnung an den Reiz anstelle der Blasen schwielige Auflagerungen. In unserm Falle wäre der Vorgang so zu denken, daß die empfindlichere Haut bereits bei normaler Inanspruchnahme mit Bildung einer Hyperkeratose antwortet. So dürfte vielleicht die Entstehung der Hyperkeratosen ihre erzwungenste Lösung finden.


Zusammenfassung:

Die klinischen Besonderheiten des Falles haben zu seiner Mitteilung Veranlassung gegeben. Das Fehlen der Heredität ist nichts ungewöhnliches. Dagegen dürfte das späte Einsetzen des Leidens zu den seltenen Vorkommnissen gehören. Die Atrophien an den Streckseiten der Extremitäten, in ihrer Beschaffenheit an die Akrodermatitis atrophicans erinnernd, wecken mit ihrer vollkommen symmetrischen Ausprägung und gleichmäßigen Ausbildung in besonderem Maße die Aufmerksamkeit. Die Hyperkeratosen an den Volar- und Plantarflächen der Hände bezw. Füße sind nicht minder ungewöhnlich. Milien und Hornzystenbildungen fehlen. Häufiger ist das Mitbefallensein der Schleimhäute beschrieben worden. Zu diesen, die eigentliche Erkrankung betreffenden Symptomen gesellen sich andere Störungen, die in das Gebiet der Vasoneurose und der vegetativen Störungen fallen. Neben den Zeichen einer Akrozyanosis chronica oder eines mäßigen Raynaud und einer ausgesprochenen Labilität des Gefäß-Systems, auch auf psychische Reize, bestehen Erscheinungen, wie ausgeprägter Dermographismus, Hyperidrosis in den Achselhöhlen, Darmspasmen und Menstruationsstörungen, welche letztere keine organische Grundlage haben. Es sind Erscheinungen, welche die Patientin als »vegetativ stigmatisiert« kennzeichnen. Sie machen zusammen mit den klinischen Besonderheiten, der vor allem auffälligen Symmetrie der Affektion an den Extremitätenenden, die Erkrankung um so interessanter, als die Reizbarkeit und Labilität des Gefäß-Systems unter dem Einfluß des Nerven-Systems, die Angioneurose, von vielen Seiten zur ursächlichen Erklärung der Epidermolysis bullosa herangezogen wurde. Es konnte daher nicht ausbleiben, daß den dahin zielenden Theorien und Ansichten eine besondere Beachtung geschenkt wurde, ohne ihnen alleinige Geltung verschaffen und das Krankheitsbild unseres Falles mit ihnen erklären zu wollen.

Zum Schluß erlaube ich mir, Herrn Professor Dr. Mulzer für die gütige Ueberlassung des Themas sowie des Materials ergebenst zu danken.

Literatur=Verzeichnis.

- Bettmann . . : Arch. f. Dermat. u. Syph. 1901, Bd. 55, S. 323.
 " : Dermat. Zeitschr. 1903, Bd. 10, S. 561.
 " : Epidermolysis bullosa in Rieckes Lehrbuch der Hautkr.
 VII. Aufl. 1923.
- Colombini . . : Monatsh. f. prakt. Dermat. 1900, Bd. 30, S. 457.
- Curschmann . : Vasomotorische und trophische Erkrankungen, Hdb. d.
 inn. Medizin.
- Darier . . : Grundriß der Dermatologie.
- Finger und
 Oppenheim : Die Hautatrophien.
- Goldscheider : Monatsh. f. prakt. Dermat. 1882, Bd. 1, S. 163.
- Herzfeld . . : Berl. klin. Wochenschr. 1893, Nr. 34, S. 820.
- Hoffmann . . : Münch. med. Wochenschr. 1895, Nr. 3, S. 45.
- Kaniky und
 Sutton . . : Monatsh. f. prakt. Dermat. 1910, Bd. 50, S. 375.
- Köbner . . : Deutsche med. Wochenschr. 1886, S. 21.
 " : Archiv f. Dermat. u. Syph. 1904, Bd. 70, S. 125.
- Lichtwitz . . : Stoffwechselerkrankung. Hdb. der inneren Medizin.
- Luithlen . . : Mracek Handb. d. Hautkr. Bd. 1, S. 738.
 " : " " " " " " 3, S. 128.
- Malinowski . : Monatsh. f. prakt. Dermat. 1910, Bd. 50, S. 325.
- Mayr und Katz : Archiv f. Dermat. u. Syph. 1922, Bd. 139, S. 215.
- Polland . . : Dermatol. Zeitschr. 1916, Bd. 23, S. 385.
- Sagakuchi . : Archiv f. Dermat. u. Syph. 1915, Bd. 121, S. 397.
- Siemens . . : Archiv f. Dermat. u. Syph. 1921, Bd. 134, S. 454.
 " : Archiv f. Dermat. u. Syph. 1921, Bd. 136, S. 69.
 " : Archiv f. Dermat. u. Syph. 1922, Bd. 139, S. 80.
- Stühmer . . : Archiv f. Dermat. u. Syph. 1919, Bd. 126, S. 568.
- Török . . : Archiv f. Dermat. u. Syph. 1899, Bd. 47, S. 402.
- Zondek . . : Die Krankheiten der endokrinen Drüsen. II. Aufl. 1926.
- Zweig . . : Archiv f. Dermat. u. Syph. 1918, Bd. 125, S. 1.



Lebenslauf.

Ich, Walter Drosdek, wurde als Sohn des Apothekers Heinrich Drosdek und seiner Ehefrau Anna, geb. Moege, am 7. VI. 1896 zu Altberun O/S. geboren. Ostern 1906 trat ich in das Kgl. Gymnasium zu Hirschberg in Schlesien ein, bestand daselbst im August 1914 das Notabitur und ging als Freiwilliger ins Feld. 1916 fiel ich in russische Gefangenschaft und kehrte aus derselben im September 1920 in die Heimat zurück. Das medizinische Studium begann mit dem Wintersemester 1920/21 in Breslau und endete daselbst im März 1925 mit bestandenen Staatsexamen. Vom 15. Mai 1925 bis 15. November 1926 war ich an der I. med. Klinik der Charité beschäftigt, war dann kurze Zeit in der chir. Poliklinik (Prof. Klapp) und bin seit dem 1. Mai 1927 als Assistent an der Universitäts-Hautklinik Hamburg tätig.

